

Las aves de Coronda 2016

M. Florencia David, Claudia Nigro
y Cintia Manoni



Estimados/as amigos/as de Coronda, el equipo docente de la Cátedra Libre de fauna silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR los invita a conocer las aves de esta ciudad y la región. En este e-book van a encontrar 40 de las 400 especies que existen en la provincia de Santa Fe.



Créditos Fotográficos

María Florencia David

Mónica Díaz

Cintia Manoni

Claudia Nigro

Aves de Coronda / María Florencia David ... et.al.l - 1a ed. - Rosario : UNR Editora.

Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2016.

E-Book.

ISBN 978-987-702-114-1

1. Aves. 2. Conservación Ambiental. 3. Educación Universitaria. I. David, María Florencia CDD 598.33


ISBN 978-987-702-115-8



9 789877 021158

Estimado/a amigo/a...

A la hora de identificar las especies en el campo, es necesario conocer bien la topografía del ave, o lo que es lo mismo, su aspecto externo. El plumaje, es el carácter que más se utiliza para la identificación. Es por ello, que es importante conocer las diferentes partes del cuerpo del ave, para saber por ejemplo, cómo se distribuyen las plumas y los colores.



Orden Anseriformes

Pato capuchino

(*Anas versicolor*)

Pico amarillo
y azul.
Boina negra.

El nombre...

Anas (Lt.) significa "ánade, pato" y *versicolor* "de varios colores", esto hace referencia a la coloración del pico: negro, celeste y anaranjado..

Una boina negruzca que baja hasta la nuca, mejillas y garganta de color crema, y un pico ancho y tricolor (celeste con base amarilla y culmen negro) le dan al pato capuchino un aspecto llamativo. En las hembras el pico es amarillo más pálido, particularidad utilizada para diferenciar los sexos a simple vista.

En el resto del cuerpo, su plumaje es muy característico, poseen el pecho manchado y el dorso posterior de un color pardo oscuro, con grueso barrado en los flancos, mientras que el tercio posterior es gris plateado finamente barrado.




Pato capuchino



Las patas de estas aves son cortas, lo que les da un andar gracioso en tierra. Son de diferente color en machos y hembras, siendo amarillas y negras respectivamente. Sus dedos, unidos por una membrana interdigital, se transforman en verdaderos remos, lo que les facilita la natación. Viven en parejas o grupos pequeños. Buscan su alimento en la orilla de ríos o lagunas y lo hacen nadando o caminando. Tienen un vuelo rápido y con mucho batido de alas. Habitan ambientes acuáticos con vegetación.

Dato Útil

Se le llama "espejo", a las plumas brillantes y coloridas de los patos, que se pueden observar en el ala únicamente cuando está extendida durante el vuelo. En el pato capuchino, este tiene reflejos azules o verdes entre fajas blancas.



Orden Anseriformes

Chaja

(*Chauna torquata*)

El nombre...

Chauna (Gr.) significa "esponjosa, blanda" y se refiere, según Félix de Azara, a la consistencia fofo del ave; y *torquata* significa "adornada con collar".

Copete.
Dos collares
en cuello

Esta ave, de cuerpo voluminoso, posee un aspecto inconfundible. Mide entre 80 y 90 cm. Posee un pico similar al de la gallina y una coloración rojiza alrededor de los ojos. El cuello presenta dos collares, uno negro y otro blanco y se destaca en su cabeza un copete occipital, ausente en ejemplares

juveniles. Su plumaje es de color gris, más oscuro en la región dorsal y más claro en la ventral. Las plumas presentan un reborde casi blanco que le da al plumaje un aspecto estriado.



Sus alas son anchas, con espolones en el borde anterior. En vuelo, muestran sus alas desplegadas de color blanco y negro que se ven desde abajo y esto las hace parecidas a las águilas.



Chajá.



Las patas son gruesas y de color rojizo; los dedos de estas aves carecen de membrana interdigital.





Si bien es un ave terrícola se lo encuentra siempre en zonas de lagunas, esteros y bañados, pastizales y campos húmedos del norte y centro de nuestro país. Se suele ver en pareja en la época reproductiva y en grupos numerosos en invierno. Machos y hembras no presentan dimorfismo sexual (no hay diferencias visibles entre machos y hembras) pero se los puede identificar por su canto: el macho lo hace con la inconfundible onomatopeya "chajá" del cual deriva su nombre vulgar.

Se alimenta de hierbas en las orillas.

Orden Podicipediformes

Macá común
(*Rollandia rolland*)

Abanico
blanco
en cara en época
nupcial.
Iris rojo

El nombre ...

Proviene de Master Gunner Rolland, uno de los tripulantes de la corbeta francesa L' Uranie que entre 1827 y 1830 cruzó el Cabo de Hornos y naufragó en Malvinas. Rolland con su habilidad para la caza, ayudó a que la tripulación sobreviviera al naufragio. Entre las especies que cazó para alimentar a sus compañeros, estaba el hasta entonces desconocido Macá común.


En el mundo se reconocen 22 especies de macaes; en Argentina, encontramos 6. El macá común, es una de ellas. Es un ave mediana, que mide entre 23 y 26 cm. Tiene un aspecto homogéneo, dorso y cuello son de un color pardo oscuro. En la época nupcial los machos presentan un penacho



auricular blanco con algunas estrías negras, este adorno sirve para atraer a las hembras. Los ojos son de un llamativo color rojo.

Macá común

El pico es negro, corto y cónico; a diferencia de los patos, que lo tienen ancho y chato.



Los macaes son excelentes buceadores, es por ello que los vemos siempre asociados a ambientes acuáticos. Los encontramos en ríos, lagunas y hasta en espejos de agua temporarios. Es raro verlos en vuelo, solo lo hacen de noche y para habitar nuevas lagunas ... tampoco es común verlos caminar y si lo hacen es de un modo muy particular: muestran un andar erguido, algo torpe, ya que tienen las patas muy atrás. Se alimentan de peces, larvas e insectos acuáticos; los cuales obtienen buceando. Es común verlos cazar zambulléndose y apareciendo a una corta distancia. Cuando nadan, lo hacen balanceando la cabeza de un lado a otro...Se los encuentra solos, en pareja o en grupos reducidos.

Orden Ciconiformes

Cigüeña

(*Ciconia maguari*)

Grande.
Blanca con alas
negras.

El nombre...

Ciconia (Lt) significa "cigüeña" y *maguari* significa "muchas que pasan en fila", aunque comúnmente se la observa sola.

Es un ave muy grande. Mide entre 90 y 120cm. El cuerpo es de color blanco con el tercio posterior negro y el contorno de los ojos es rojo. Los juveniles son de color pardo negruzco pero a medida que crecen, se vuelven blancos. Las alas son grandes y al vuelo las extiende mostrando las plumas de las alas negras. El pico de las



cigüeñas es largo y puntiagudo, de color gris claro en la base y oscuro en la punta. El cuello es largo y al vuelo, lo lleva extendido. Las patas, también largas, son de un atractivo color rojo.



Dato Útil

El pico de las cigüeñas presenta una abertura en la base, lo que permite que se expanda la garganta para tragar el alimento entero.

Cigüeña

Elige los ambientes acuáticos, pero también se la puede ver en el campo, especialmente en época de lluvias abundantes. Si bien son solitarias, se pueden encontrar en parejas o grupos reducidos en lugares donde abunde el alimento. Son muy poco activas; es común verlas inmóviles largo rato, a la espera de que su presa se acerque. Poseen una dieta muy variada a base de peces, ranas, pequeños reptiles, invertebrados varios y hasta roedores pequeños. El inicio del vuelo es lento, comienza con aleteos torpes pero enérgicos seguido de un carreteo corto. Ascenden a gran altura favorecidas por las corrientes de aire cálido y allí se las ve planear en círculo, imitando el vuelo de águilas y jotes. Algo bien curioso es su nido, se trata de una gran plataforma sólida, construida con diversos vegetales. Son tan fuertes, que podrían soportar el peso de una persona.



Orden Suliformes

Bigua

(*Phalacrocorax brasilianus*)

Color negro.
Cuello largo.

El nombre...

Phalacrocorax significa "cuervo calvo" y *brasilianus* "brasileño, de brasil".

El biguá es un ave de tamaño mediano que mide entre 55- 75cm; se caracteriza por el negro homogéneo de su plumaje y por su largo cuello. Los juveniles muestran un color pardo y el pecho más claro. En época reproductiva, los adultos exhiben un penacho de plumas blancas en la sien.

El pico de estas aves es

delgado y largo, de color negro, con amarillo en la base y de bordes blancos; en su extremo presenta un gancho para evitar que el alimento, que son peces, se le resbale.

Las patas son cortas, de color negro y se ubican atrás del cuerpo, lo que les permite mantener una postura bien erecta.



Bigua

Todos los dedos están unidos por una membrana interdigital para facilitarles la natación. Las alas son largas y redondeadas y la cola rígida




Es característico verlos volar al ras del agua, siempre con el cuello extendido.



Bigua

Habita ambientes acuáticos como lagunas, ríos, esteros, comúnmente en lugares donde hay ramas o árboles que usan como percha para posarse. Se los suele ver solos o en parejas y en épocas reproductivas forman numerosas colonias para nidificar. Nadan sumergiendo todo el cuerpo y solo dejan afuera del agua el cuello y la cabeza.



Dato Útil

Es muy común ver a los biguás posados con las alas extendidas, esto se debe a que a diferencia de otras aves, las plumas no son del todo impermeables; es por ello que cuando se zambulle necesita luego secar sus plumas al sol.

Orden Pelecaniformes

Garza blanca
(*Ardea alba*)

Blanca.
Pico amarillo
y patas negras.

El nombre...

Ardea (Lt) significa "garza", proviene del sánscrito "ard" que es moverse, agitarse, haciendo referencia al movimiento de estas aves y *alba* "blanco".



Es la más grande de las garzas blancas, midiendo 65cm. Su plumaje es completamente blanco, abundante y de aspecto suave.

Garza blanca




En épocas reproductivas desarrolla largas plumas despeinadas en el dorso que se denominan EGRETES y que están presentes tanto en machos como en hembras, aunque son más vistosas en los primeros. Alrededor de los ojos tiene un color verde claro a amarillo que puede extenderse hasta el pico. El mismo, es de color amarillo anaranjado, grueso y largo.

El cuello largo, fino y muy flexible es característico de esta especie; puede verse extendido cuando camina o replegado en forma de S cuando está en reposo o durante el vuelo. Esto la diferencia de cigüeñas y bandurrias, que lo estiran al volar. Las patas son de color negro, muy largas lo que le permite nadar en



aguas poco profundas o levantar vuelo rápidamente pero no correr. Durante el vuelo se las observa extendidas. En los ejemplares juveniles, pueden verse de color verde negruzco.



Garza blanca



Elige como hábitats ambientes acuáticos: ríos, lagunas, esteros. Es común encontrarlas entre los juncos o en lo alto de los árboles próximos al agua. Se la puede ver sola o formando grandes grupos incluso junto a otras Garzas como Mora o Azulada o junto a individuos de otras familias como biguá, gaviotas, espátulas, cuervillos y gallaretas.



Garza blanca

Se alimenta de peces, que ingieren enteros, ranas, renacuajos e insectos acuáticos. Pero además consumen algunos reptiles, pequeños roedores e insectos terrestres cuando se alejan de la orilla.



Dato Útil



En campo se la diferencia de las otras garzas blancas porque tiene pico amarillo y patas negras.

Curiosidad

Las garzas blancas estuvieron, durante parte del siglo XIX y XX, al borde de la extinción, debido a que durante mucho tiempo fueron cazadas para utilizar sus plumas como adornos de sombreros de lujo.

Orden Pelecaniformes

Garcita azulada
(*Butorides striatus*)



Gris azulada.
Ojos pardos.

El nombre...

Butorides (Gr.) significa "semejanza" y *striatus* "estriado", haciendo referencia a la parte ventral de cuello y pecho que es estriada.



Su cuerpo es de color gris azulado. Presenta corona negra y en la nuca tiene largas plumas, también negras. La parte ventral del cuello y pecho es estriada blanca y rufa. Las cobertoras, presentan un borde blanco acanelado muy llamativo. Los ejemplares juveniles, son de color pardo (que más tarde se vuelve gris) y el estriado en ventral del cuello es mayor.

Garcita azulada



El pico de estas aves es largo, de color negro y amarillo y las patas son cortas y también amarillas. El cuello es largo y posee en la parte media una articulación especial que le permite doblar el cuello en forma de "S", muy útil durante la caza.

Se trata de un ave solitaria que habita ambientes acuáticos con vegetación. Se la suele ver sobre perchas bajas que sobresalen del agua o recorriendo, en forma silenciosa y agazapada, bañados en busca de comida. Su dieta es a base de peces, anfibios, reptiles e invertebrados. Cuando caza mantiene el cuello recogido y lo estira violentamente para la captura de la



presa. Realiza un vuelo bajo y pausado, con pocos aleteos y lleva el cuello en forma de "S" lo que nos permite diferenciarla de cigüeñas y bandurrias, que lo llevan estirado.

Orden Pelecaniformes

Garza mora

(*Ardea cocoi*)

Gran tamaño.
Capuchón negro.

El nombre...

Ardea (Lt.) significa "garza" y *cocoi* (tupi) "garza".



Se la considera la más grande de las garzas, ya que mide entre 75 y 125 cm. Su cuerpo es esbelto, de color gris en dorso y alas. El vientre es negro y los muslos blancos. Posee boina negra y en la nuca un copete negro, característico de todas las garzas, que se observa bien en las épocas reproductivas.

Garza mora



Su cuello es largo, de color blanco con estriado gris oscuro en ventral. Las patas son largas, de color verdoso y sin membrana interdigital, lo que le permite vadear aguas someras. Los ejemplares juveniles no presentan copete y el cuello y la parte ventral del cuerpo, son de color grisáceo.



Habita ambientes acuáticos, costas de ríos o lagunas y zonas inundables donde encuentra su alimento. Es solitaria y arisca, pero en épocas de nidación pueden unirse varias en un mismo territorio a modo de defensa. Pesca con movimientos lentos, intercalados con pausas. Se alimenta de peces, anfibios, reptiles e invertebrados. Realiza un vuelo pausado, con pocos aletazos y se la considera entre las garzas, la de vuelo más lento.

Orden Pelecaniformes

Cuervillo de cañada

(*Plegadis chihi*)

Pico largo,
curvo
y oscuro.

El nombre...

Plegadis significa "el que lleva guadaña" y alude a la forma del pico de estas aves, que es curvo y delgado; y *chihi* es la onomatopeya de la vocalización.



Su cuerpo es de color castaño oscuro, con la cabeza y el cuello rojizos. El plumaje de las alas es iridiscente, con reflejos metálicos verdosos y azules, aunque puede verse totalmente negruzco según la incidencia de la luz solar. Los ejemplares jóvenes presentan en la cabeza y parte de cuello manchas blancas. Es característico de estas aves el pico largo, fino y curvo, el cual le sirve para localizar mediante el tacto



los invertebrados de los cuales se alimenta. Este cuervillo mide aproximadamente 45- 50cm.

Cuervillo de cañada



Habita ambientes acuáticos y áreas rurales. Forman grandes colonias y se los puede ver mezclados con ejemplares de otras especies como teros, garzas, playeros, pitotoy, o espátulas. Es muy común verlos en la orilla, con el pico sumergido buscando alimento, que se basa principalmente en invertebrados , vegetales y algunos peces pequeños.



Cuervillo de cañada



Vuelan con fuerte aleteo, en grandes bandadas formando una "V", con las patas extendidas que sobrepasan la cola y el cuello estirado; característica, esta última, que los diferencia de las garzas.



Orden Pelecaniformes

Cuervillo cara pelada
(*Phimosus infuscatus*)

Pico largo y curvo.
Cara sin plumas

El nombre...

Phimosus (Gr.) significa "silencioso" e *infuscatus* "oscuro".

Es muy similar al cuervillo de cañada (*Plegadis chihi*). Mide aproximadamente 40cm. Su cuerpo es de color negro intenso, opaco, aunque se pueden observar reflejos azules o verdes en las alas, dorso y cola. La cara y el pico son de color rosado, contrastando mucho con el color oscuro del cuerpo. La



La cara se encuentra desprovista de plumas, de allí su nombre vulgar y el pico es muy llamativo, largo, fino y curvo. Los ejemplares juveniles son más opacos y su pico es oscuro.



Cuervillo cara pelada



Al vuelo, sus patas cortas no sobrepasan la cola, esta característica permite diferenciarlos del cuervillo de la cañada.



Habita ambientes acuáticos, zona de humedales y campos húmedos. Se lo puede observar en grupo a veces muy grandes y compartiendo su hábitat con otras especies, como cuervillo de cañada y tero real entre otros. Se lo puede ver sobre los árboles o con las alas extendidas al sol, imagen que recuerda al biguá. Vuela con fuerte aleteo y el cuello estirado, característica que lo diferencia de las garzas. Lo hace en grupo, pero no formando una "V" como el cuervillo de cañada. Se alimenta de invertebrados, peces, etc., en aguas someras o pastizales de materia verde.



Orden Gruiformes

Gallareta chica

(*Fulica leucoptera*)

Escudete y
pico amarillos

El nombre...

Fulica (Lt.) significa "ave acuática" y *leucoptera* "ala blanca", haciendo referencia al borde blanco de las alas en vuelo.

Las gallaretas son aves acuáticas de cuerpo rechoncho, fácilmente reconocibles. Son de tamaño mediano, miden entre 30 y 40 cm.

Su cuerpo es de un color negro homogéneo, desde la cabeza a la cola. El pico es delgado y alargado, de color amarillo y presentan un escudete frontal generalmente amarillo, aunque puede haber algunos naranja.

Las alas son cortas y redondeadas y en vuelo, la punta de las plumas secundarias, de color blanco, forman un delicado borde. La cola es corta y con plumas subcaudales blancas que se pueden ver cuando la levanta al desplazarse en el agua.


Viven en aguas con vegetación acuática densa, con matorrales húmedos que les permitan obtener material para hacer sus nidos, que son verdaderas plataformas flotantes, y esconderse de extraños.



Gallareta chica



Se las observa generalmente en grupos numerosos y mezclados con otras aves de la misma familia, nadando en aguas abiertas o con vegetación.



Gallareta chica



Las gallaretas, como muchas aves acuáticas, para volar requieren un carreteo previo que pueden hacer en tierra o desde el agua. Una vez en vuelo, pueden realizar importantes desplazamientos aéreos, casi siempre de noche. Son aves ruidosas, lo que muchas veces permite advertir su presencia mientras se mantienen escondidas entre la vegetación. Su alimentación es a base de hierbas, semillas, invertebrados y pequeños vertebrados. Se alimenta nadando, zambulléndose o en las orillas.



Orden Gruiformes

Pollona pintada (*Porphiriops melanops*)

Pico y
escudete
verdosos.

El nombre...

Porphiriops (Gr.) significa "de aspecto" y *melanops* "cara negra", haciendo referencia a su coloración negruzca de la frente.

Esta pollona mide aproximadamente 20 cm. La cabeza y el cuello son grises y la frente negruzca. El pico corto, grueso, y de color amarillo, resalta entre el gris de la cabeza. En la frente posee un escudo amarillento verdoso. El iris es de un llamativo color rojizo. El dorso del cuerpo es pardo y se hace castaño hacia los lados y



vientre. En el flanco presenta manchas blancas muy llamativas, a las cuales le debe su nombre. Los ejemplares juveniles se diferencian de los adultos, ya que son de color pardo claro, la garganta es blanca y en lugar de manchas, tienen estriaciones blancas y su pico es negro. Los pichones son totalmente negros

Pollona pintada



Habita áreas palustres, con vegetación flotante principalmente. Es muy confiada y se la suele ver en pareja, nadando entre la vegetación con movimiento rítmico de la cabeza, o caminando sobre la vegetación flotante. También se la puede ver carretear si se siente en una situación amenazante. Se alimenta de larvas e insectos que encuentra entre la vegetación.



Orden Gruiformes

Carau

(*Aramus guarauna*)

Manchitas blancas en el cuello.

El nombre...


Aramus (Gr) significa "garza" y *guarauna* "ave negra", haciendo referencia al color del carau.

El carau es un ave robusta, de 65 cm, muy similar al cuervillo, con el cual se lo sabe confundir. Presenta un color homogéneo, pardo, y un salpicado blanco a lo largo del largo cuello. El pico es largo, casi recto, de color amarillento



con la punta negruzca. Las patas son largas y de color grisáceo. Emite fuertes ruidos con la onomatopeya *krau-krau*, sonido que se asemeja a su nombre vulgar.

Vive en ambientes acuáticos donde abunda la vegetación, que le sirve de refugio. Solo, en pareja o en grupos reducidos, se lo puede ver en el agua, en la tierra o posado sobre los árboles. Camina lento, moviendo el cuello.





Dato Útil

Su vuelo característico nos ayuda a diferenciarlo de otras especies: lleva el cuello extendido y algo inclinado hacia abajo, con un aleteo entrecortado y separa las plumas primarias del ala, que parecen ser dedos.



Orden Charadriiformes



Tero real

(*Himantopus mexicanus*)

Pico largo y fino.
Patatas rojas y delgadas.

El nombre...

Himantopus (Gr.) significa "de piernas largas" y *mexicanus* "de méjico".

El tero real se caracteriza por su cuerpo esbelto de largas patas; mide 34cm aproximadamente. La cabeza es blanca, pero la parte trasera de los ojos, la nuca y la parte dorsal del cuello, son negras. El cuello se separa del lomo por una franja blanca. Las alas son negras y la cola blanca. Presenta un pico



largo y fino, de color negro y las patas también son largas y muy delgadas, de color rosado intenso. Los ejemplares juveniles se diferencian de los adultos por el color pardo del dorso y el color rosa pálido de las patas.

Habita ambientes acuáticos: lagunas, orilla de ríos o arroyos, campos inundados, siempre en zona de aguas tranquilas y bajas, con poca o nula vegetación. Se lo ve en pareja o grupos, contrastando por su colorido entre las aves de otras especies que se encuentran en el lugar.

Tero real



Posee un andar elegante y pausado. Es centinela, ante situaciones de peligro emite ruidos que se asemejan al ladrido de un perrito y levanta vuelo con rapidez. Se alimenta de insectos acuáticos, lombrices y moluscos que captura en aguas someras o en el barro de las orillas. Lo hace con la cabeza baja y moviendo el pico de un lado a otro de forma rápida.



Tero real



Anida en las márgenes, formando grupos de nidos dispersos, contruidos con ramitas cortas y pasto. Pone 3 o 4 huevos muy parecidos a los del tero común: ovalados, color pardo y con manchas negras. Los pichones nacen todos al mismo tiempo y son llevados por los adultos hasta la cercanía del agua, para que se alimenten. Hace ésto hasta que aprenden a volar y se independizan.



Orden Charadriiformes



Jacana
(*Jacana jacana*)

Escudete rojo.
Dedos muy
largos.

El nombre...

Nombre tupí, significa "el que tiene el ojo alerta"

Se la conoce también como Gallito de agua. Mide entre 20 y 25 cm, siendo la hembra más grande que el macho. Cabeza, cuello y zonas ventrales del cuerpo son de color negro brillante mientras que el lomo y alas son castaño rojizo. Las plumas primarias y secundarias del ala



son de color amarillo verdoso, detalle muy llamativo, que se observa cuando está en vuelo o extiende las alas. Éstas, presentan un espolón. Su pico de color amarillo, es fino, largo y presenta un escudete rojo.

Las patas son largas (13 cm) al igual que los dedos, los cuales además son finos y se los puede ver claramente cuando vuelan, ya que los llevan extendidos.



Los ejemplares juveniles suelen verse entre los adultos y el plumaje es algo diferente: de un color blanco vistoso en ventral y en las cejas y el dorso cambia a pardo.



Orden Charadriiformes



Rayador
(*Rhynchops niger*)

Mandíbula inferior más larga.

El nombre...

Rhynchop (Gr.) significa "cara pico" y hace referencia al enorme pico; mientras que *niger* (Lt.) es "negro".



El aspecto "achaparrado" junto al desproporcionado pico, le dan al rayador, un aire singular. Esta ave que mide entre 40- 45 cm, es de color pardo negruzco en el dorso y blanco en la zona ventral. Las patas son cortas, de color rojo intenso y presentan membranas entre los dedos. La cola es larga de color oscura. El pico, prominente, es rojo en la base y negro en la punta.

Curiosidad

El pico del rayador es único entre las aves, la mandíbula superior es mucho más corta que la inferior.

Rayador



Habitán ambientes acuáticos como ríos y lagunas; también se los ve en la orilla del mar. Es común verlos formando grandes bandadas, mirando todos para el mismo lado. Se mezclan con otras aves en bancos de arena de ríos y lagunas, lugares donde se concentra su alimento. Es común verlos descansar con el pico escondido entre las plumas del dorso. Levantan vuelo todos juntos, asentándose a corta distancia cuando se sienten amenazados o en tandas, para buscar su alimento.



Rayador



El rayador le debe su nombre vulgar a su particular técnica de caza, única entre las aves: vuela en línea recta, muy cerca del agua, con las alas hacia arriba para no mojarlas; con la cabeza hacia abajo y el pico abierto de tal manera que con la mandíbula inferior sumergida, parece "rayar" el agua. Cuando obtiene la presa, la aprieta bien fuerte, dobla la cabeza hacia atrás para asegurársela y luego la traga. Para cazar, prefiere el final de la tarde y noche. Se alimenta de peces pequeños, crustáceos y organismos que puedan encontrarse flotando en el agua.



Orden Charadriiformes



Atí

(*Phaetusa simplex*)

Achaparrado.
Pico grande,
amarillo.

El nombre...

Phaetusa (Gr.) significa "la brillante" y *simplex* "simple, puro".



El Atí mide entre 35 y 40 cm de longitud. Su aspecto es similar al del rayador. La corona es color negro y se extiende hasta alrededor de los ojos, el dorso es gris y el resto del cuerpo blanco. Las alas, al igual que el cuerpo, son tricolor, y al vuelo se observa un patrón muy llamativo: en dorsal es gris, seguido de una franja blanca y las puntas son negras. La cola es larga, de color negro. El pico es grande y robusto, color amarillo al igual que las patas. Estas son cortas y entre sus dedos presentan una membrana.



Habita ambientes acuáticos como ríos y lagunas, pero prefiere los lugares donde hay dunas o bancos de arena. Se lo ve solo o en pareja, y forma grandes bandadas con aves de otras especies. Es muy común verlos mezclados con los gaviotines, aves que tienen una forma muy similar, pero se los diferencia a simple vista por su tamaño: el Atí es bastante más grande.

Las bandadas suelen estar asentadas en los bancos de arena y levantan vuelo y todas al mismo tiempo, cuando se sienten amenazadas. También es común verlos posados en ramas o troncos que sobresalen del agua. Vuelan bajo, mirando la superficie del agua y se zambullen para pescar o cazar insectos al vuelo.

Orden Charadriiformes



Gaviotín chico común
(*Sterna superciliaris*)

Achaparrado.
Pico amarillo.
Ceja blanca.

El nombre...

Sterna (Ig.) significa "golondrina de mar" y *superciliaris* "que tiene ceja".



Este gaviotín mide entre 20 a 25 cm y su tamaño, es una de las características más relevantes para diferenciarlo con el Atí; que es más grande y con el que comúnmente se encuentra. En la cabeza, nuca y alrededor de los ojos, su plumaje es negro; mientras que en la frente y cejas es blanco. El cuerpo es delgado, de color gris en el dorso y blanco en la parte ventral. Las alas son grises con las puntas negras. El pico es fino y recto y de color amarillo. Las patas son muy cortas y también amarillas.

Gaviotín chico común



Generalmente se los ve en parejas o en bandadas pequeñas, y es común verlos mezclados entre otras especies, principalmente con el Atí. Son muy ágiles durante el vuelo. Se alimentan de peces y anfibios pequeños, que capturan volando al ras del agua, con el pico hacia abajo o zambulléndose.



Orden Charadriiformes

Gaviota capucho café
(*Chroicocephalus maculipennis*)

Capuchón
pardo.

El nombre...

Chroicocephalus maculipennis, (Lt.) "con mancha en la pluma".



Mide aproximadamente 35 cm. En épocas reproductivas se puede observar un llamativo capuchón marrón negruzco, al que le debe su nombre vulgar, pero durante el reposo sexual este se reduce a una mancha parda oscura cerca del oído. Presenta un delicado anillo periocular blanco y el iris es pardo. El cuello es blanco. El dorso y las alas son gris claro y la parte ventral del cuerpo es blanca.

En vuelo, cuando despliega sus alas se observa una franja negra con los bordes blancos en la punta de las mismas.

Gaviota capucho café



El pico y las patas son rojizos. Los ejemplares juveniles se diferencian de los adultos en que la parte dorsal del cuerpo es manchado de pardo y canela y posee una franja caudal negruzca. Las patas y el pico son menos coloridos. Habita áreas costeras y humedales y se la suele ver en el campo o cerca de los basurales. Son muy sociables y ruidosas. Forman grupos numerosos con incluso con individuos de especies diferentes. Se las puede observar nadando pero es más común verlas asentadas en la arena o formando grupos de alimentación. Son omnívoras, consumen peces, invertebrados, huevos, pichones y carroña.

Orden Charadriiformes



Chorlito de collar
(*Charadrius collaris*)

Collar
pectoral negro.

El nombre...

Charadrius es el nombre clásico de un ave acuática y *collaris* (Lt.) "con collar".



Mide aproximadamente 13 cm. La cabeza es grande si se la compara con el resto del cuerpo. Posee una llamativa corona negra, rufa y parda. La frente y la garganta de color blanco. El cuello es corto y posee una línea negra que lo circunda a modo de collar, de ahí su nombre. El pico es negro y corto, y parece continuarse con el ojo. La parte dorsal del cuerpo es parda y ventralmente, blanco. Las patas son de un color canela, un tanto amarillentas. En los juveniles, la corona y el collar son pardos.

Chorlito de collar



Es residente en buena parte del país. Habita la playa de lagunas y bañados, costas de ríos, arroyos y bancos de arena. Es muy activo e inquieto y corre velozmente semejando una bolita rodando en la arena. Se lo ve solo o en parejas, picoteando la superficie con gran rapidez. Si bien la alimentación es muy variada, predominan insectos y lombrices, entre otros. Forma nidos muy precarios en el suelo.



Orden Cuculiformes

Pirincha

(*Guira guira*)

El nombre...

Copete.
Cola con banda
negra y punta
blanca.

Guira en lengua guaraní significa "ave, pájaro".

Mide aproximadamente 40 cm. Su cuerpo es esbelto, alargado y su plumaje es "desordenado", de aquí su nombre vulgar. La parte dorsal es de color pardo negruzco, con estriado blanco y la parte ventral, es color crema con estriado oscuro en el pecho. Presenta un característico copete despeinado, eréctil, de color canela. El pico es corto, curvo y de color anaranjado y el iris es claro.




Otra característica distintiva, es su larga cola que suele caer péndula y es de tres colores: canela, pardo oscuro y blanco. Posee patas cortas y cuatro dedos, el primero y el cuarto dirigidos hacia adelante y los otros dos, hacia atrás; esta disposición de los dedos le permite trepar.

Pirincha



Las pirinchas viven en grupos pequeños y se las suele ver acicalándose mutuamente o sacándose parásitos externos, por lo que en algunos lugares a este ave se lo llama "piojoso". Vuelan en fila, de forma lenta, con algunos aleteos, y planeos prolongados. Buscan su alimento caminando en el suelo. Su dieta es variada, se alimentan de insectos, anfibios, reptiles, frutos, huevos y pichones de otras aves.

Habita ambientes abiertos con árboles, tanto en la ciudad como en zonas rurales. Se los ve en grupos numerosos y son muy bullangueros.



Pirincha



Posan en los árboles de espalda al sol y duermen formando grupos de varios individuos apretados unos con otros. Esto les permite abrigarse del frío ya que son muy sensibles a las bajas temperaturas.



Orden Strigiformes

Ñacurutú

(*Bubo virginianus*)

Grande.
Penachos
como "orejas".

El nombre...

Bubo (Lt.) significa "búho" y *virginianus* "de virginia".

Pertenece a la familia de las lechuzas, lechuzones, caburés y búhos. Es el de mayor tamaño dentro de los integrantes del grupo. Mide 50cm aproximadamente. La parte dorsal de su cuerpo es pardo negruzco y en ventral es blancuzco, con fino barrado pardo. Las alas y la cola también son barradas de color pardo. Presenta un disco facial de bordes negros, iris amarillo a anaranjado según la



incidencia de la luz y orejas triangulares que son grandes, de color negruzco y separadas entre sí. El pico es corto y muy curvo y las patas poseen garras fuertes que son utilizadas para cazar y alimentarse. La cabeza es grande y el cuello es corto y muy móvil.

Ñacurutú



El ñacurutú es un ave nocturna, que habita áreas rurales, selvas y montes donde se encuentran árboles de gran altura. Se lo suele ver solo o en pareja, en lo alto de los árboles. Su vuelo es lento y silencioso para sorprender a sus presas junto con otras características como su chillido, la mirada frontal y fija y la posibilidad de rotar el cuello 180°. Su dieta se basa en roedores, cuises, murciélagos, pájaros, reptiles, e invertebrados.

Dato Útil

El ñacurutú al igual que las otras aves de su familia son aliados del hombre en el control biológico de especies no deseadas como las ratas y ratones, conocidos y temidos por ser transmisores de un gran número de enfermedades, como la leptospirosis, hantavirus, fiebre hemorrágica argentina, entre otras.

Orden Strigiformes

Lechuza de los campanarios

(*Tyto alba*)

Disco facial
en forma de
corazón.

El nombre...

Tyto (Gr.) significa "lechuza" y *alba* "clara, blanca".

Su cuerpo es esbelto. Mide 36 cm aproximadamente. Posee una cabeza grande, cuello corto y alas anchas. Es característica por su disco facial en forma de corazón, de color blanco con el borde grisáceo o canela. La parte dorsal del cuerpo es gris, con algunas plumas color canela y posee manchas negras pequeñas. El pecho es blanco y puede o no estar salpicado con manchas



grises, que son más abundantes cerca del cuello. La parte ventral del cuerpo es blanca. Posee un iris oscuro, el pico es de color blanco, poco evidente y las patas son largas, blancas y emplumadas. Está distribuida por todo el país.

Lechuza de los campanarios

Se la ve solitaria o en pareja. Tienen hábitos nocturnos. Sus oídos bien desarrollados y la pantalla parabólica que magnifica los sonidos, los hacen buenos cazadores durante la noche. En el día se refugian en huecos oscuros, con el cuerpo siempre erguido y el pico oculto en el pecho. Realiza un vuelo lento, silencioso, lo que le permite cazar sin ser advertido. Se alimenta de roedores, reptiles,



pichones de aves, murciélagos, etc.

Curiosidad

Según los antiguos griegos las lechuzas poseen gran inteligencia. Aquí se las asocia con malos augurios; cuando en realidad son las mejores aliadas en las zonas rurales, ya que su alimentación se basa en los insectos que son plagas de la agricultura.

Orden Piciformes


Carpintero real común (*Colaptes melanochloros*)

Corona negra y
nuca roja.

El nombre...

Colaptes (Gr.) significa "picoteador" y *melanochloros* "negro verde y amarillo".

Este carpintero es el más frecuente de observar. Mide entre 23 y 26 cm. Presenta un plumaje muy colorido. La parte dorsal del cuerpo es blanca con barrado negro. La cara es de color crema, con la zona malar roja, boina negra y nuca roja (en el macho). La hembra se diferencia del macho, porque tiene la zona malar negra. La garganta es estriada blanca y



negra, el pecho es amarillo con lunares negros y el resto de la parte ventral es blancuzca, con punteado también negro. Se caracteriza por presentar un pico fuerte, recto y agudo que le permite horadar la madera de los árboles, de aquí su nombre vulgar: carpintero.

Carpintero real común



La cola es rígida y junto a la disposición de los dedos, le permite apoyarse de manera vertical en los troncos. Esta es una de las formas más características de verlo.



El nido, que es muy característico, es construido con golpeteos rítmicos del pico en el tronco hasta que se forma un hueco profundo, con entrada circular.


Se lo ve en parejas o en grupos pequeños. Puede encontrárselo en el suelo, pero lo más común es verlo pegado a los troncos o trepando. De esta manera obtienen su alimento a base de insectos, gusanos y larvas que viven en la corteza o áreas descompuestas de la madera, prestándole así un gran servicio al árbol. Su vuelo es bajo y ondulante.



Carpintero real común



Habita áreas urbanas y suburbanas de todo el país, siempre que haya árboles, ya que constituyen su fuente de alimento y lugar de nidificación.



Orden Piciformes

Carpintero campestre (*Colaptes campestris*)

Ventral y dorso
barrados.

El nombre...


Colaptes (Gr.) significa "picoteador, cincelador" y *campestris* "de llanura".

Mide 28 cm aproximadamente. La cabeza es blanca, con la parte inferior amarilla igual que el pecho. El macho posee malar rojizo y en la hembra es pardo. Posee boina negra, garganta blancuzca y el cuerpo es barrado blanco y negro, más oscuro en la parte superior. El pico es fuerte, recto y agudo. Sus patas son cortas. La cola rígida, muy similar a la del carpintero real común.



Es habitante de áreas rurales y también urbanas. Se lo ve en pareja o en grupos pequeños y se lo puede observar cerca de las viviendas que tienen aleros, ya que los buscan para dormir.

Carpintero campestre



El vuelo es bajo y ondulado, similar al resto de los carpinteros. Es un ave arborícola, aunque prefiere alimentarse de hormigas; es por eso que es muy común verlo picotear en el suelo. En los árboles descansa, se esconde y nidifica. Es muy común también, verlo posado en los postes de los alambreros rurales. Al igual que el resto de los carpinteros, cava su nido en el tronco de los árboles o en hormigueros. Éste es de boca redonda u ovalada, en sentido vertical.



Orden Coraciformes


Martin pescador chico
(*Chloroceryle americana*)

Garganta
Blanca.
Dorso verde.

El nombre...

Chloroceryle (Gr.) significa "verde y amarillo" y *americana* "de américa".

Mide 17 cm. La cabeza, grande en relación al cuerpo, es de color verde oliva y posee un pequeño copete verde. Está separada de este por una franja blanca. Presenta un leve copete verde. El pecho es rufo en el macho y verde en la hembra. El dorso es de color verde oliva. La parte ventral del cuerpo es blanca. Las alas son romas, de color verde, salpicadas



de pequeñas manchas blancas. La cola es corta y en ventral presenta barrado blanco. Una de las características relevantes de esta especie, es su pico muy desarrollado, que utiliza para pescar y acomodar la presa capturada para ingerirla por la cabeza. Su dieta se basa en peces, crustáceos e insectos acuáticos.

Martin pescador chico



Se lo ve solo o en pareja. Posa durante largos periodos de tiempo, en ramas de baja altura cerca del agua a la espera de alguna presa. Para la pesca, se zambulle abruptamente.



Orden Falconiformes

Carancho

(*Caracara plancus*)

El nombre...


Caracara (Gr.) es onomatopeya y *plancus* hace referencia al nombre clásico de una capaz diurna.

Mide aproximadamente 55 cm.

Posee cabeza grande con boina negra y cresta. El pico es robusto, con borde dentado y cera roja anaranjada. Esta última, es una zona de piel blanda, desprovista de plumas, que cubre la mitad superior del pico. El resto, es de color celeste claro y crema hacia la punta. El cuello es color crema cerca de la cabeza, pero al descender hacia el pecho se hace barrado negro más o menos denso. El resto

del cuerpo es pardo oscuro y se intercala el color crema con barrado negro. Las alas son largas y romas, de color pardo oscuro con primarias blancas y la cola también es larga.

Corona negra
y pico
robusto.



Carancho



Las patas son amarillas, largas y fuertes y son muy apropiadas para caminar. Los juveniles son de color pardo estriado y las patas son grises.



Son aves rapaces, diurnas, que habitan todo tipo de ambientes; en especial lugares abiertos, desde áreas rurales a urbanas y es muy común verlos en las banquinas de las rutas y hasta en las costas. Son buenos voladores, pero gran parte del tiempo están en el suelo o caminando. Su alimento principal es la carroña, por lo cual es muy común verlos junto a animales atropellados en rutas o en campos de cría de ganado; pero también caza presas vivas, debilitadas, picoteándolas en el cuello. Si la presa está muerta, la sostiene con las garras y tironea la carne con el pico hasta desgarrarla.

Carancho



Es muy común verlo en vuelo, llevando el alimento con el pico o con las patas. Se lo puede observar en grupos y forman parejas estables durante largos períodos. Su nido es enorme.



Orden Passeriformes

Piojito gris

(*Serpophaga nigricans*)

Dorsal gris.
Abdomen
blanco.

El nombre...

Serpophaga (GR) 'que come mosquitos' y *nigricans* (LT) 'que ennegrece', ponerse negruzco, ennegrecer.

Es de tamaño pequeño, mide 11 cm aproximadamente. Su cuerpo es color gris, más intenso en la cabeza y más claro en el pecho. Posee una corona oculta, de color gris claro. El vientre es acanelado. Las alas son color pardo con filetes más claros y la cola es oscura. Presenta un pico fino, de color negro al



igual que las patas. Habita ambientes acuáticos. Es común verlo en la orilla de los ríos, arroyos o lagunas, entre los juncales o sobre la vegetación flotante. Se lo ve solo o en pareja. Es inquieto y confiado, realiza vuelos cortos y cuando se posa abre y mueve la cola de tal manera que genera un sonido característico.

El nido tiene forma de taza, es construido con vegetales y recubierto en el interior con plumas y es común encontrarlos en puentes o alcantarillas, colgados de enredaderas o ramas que llegan hasta el agua.

Orden Passeriformes

Benteveo
(*Pitangus sulphuratus*)

Antifaz negro
y vientre
amarillo.

El nombre...

Pitangus es la latinización del nombre guaraní del benteveo y *sulphuratus* (Lt) 'azufrado, color marillo de azufre.


Es el ave más conocida en nuestro país y también se lo conoce como "bichofeo" debido a que en su canto, parece decir esa palabra. Mide unos 22cm. La cabeza es grande en relación al cuerpo. Esta es blanca y presenta corona y un ancho antifaz negro. Ante situaciones de alerta o lucha, o al amanecer, mientras canta, despliega su



corona transformándose en un copete de color amarillo. La parte dorsal del cuerpo es de color pardo y la porción ventral es amarilla. El pico es robusto y de color negro. Las alas son grandes y con primarias rufas. Las patas son cortas y negras.

Se distribuye por todo el país y en diversos ambientes, pero prefiere las zonas pobladas y húmedas como ríos, lagunas o bañados.


Benteveo



Es muy común verlo posado en cables, antenas o en el extremo de las ramas de los árboles.

Se alimenta de insectos y también de vertebrado pequeños, como lagartijas, y de algunos peces. Para capturarlos se sostiene en un mismo punto del aire, lo que se conoce como HALCONEO, en espera de su presa. Cuando ésta es un pez, lo observa desde una rama cercana al agua, vuela hasta el lugar donde está y sin zambullirse, aletea fuertemente sobre el agua hasta capturarlo. También es común verlo en la tierra, en busca de gusanos, lombrices o cerca del hombre aprovechando sus desperdicios.

Son agresivos con aves de mayor tamaño como chimango o caranchos, especialmente cuando esas aves se encuentran cerca de su nido. Con especies de menor tamaño, tienen una conducta más amistosa.



Benteveo



El nido es cerrado, construido de material vegetal y lo ubica, generalmente, entre los 2 y 8 m de altura en las horquetas de los árboles. Lo construyen en pareja y pueden ser utilizados nuevamente en la siguiente temporada reproductiva.

Sabías que...

Los benteveos cumplen una importante función en la naturaleza. Participan en el transporte y diseminación de semillas de algunos vegetales como el laurel y el tala entre otros, ya que ingieren sus frutos y deyectan las semillas en otras zonas, dispersando así las plantas y ayudando a la recuperación de áreas des pobladas de vegetación.



Orden Passeriformes

Picabuey

(*Machetornis rixosa*)

Dorso gris y
vientre
amarillo.
Pico fino

El nombre...

Machetornis: (Gr) significa 'ave belicosa', de 'machetes': luchador; y *rixosus* (Lt) 'dispuesta a pendencias, hábil en peleas'.

Mide aproximadamente 17cm. Su cuerpo es esbelto, con dorso, alas y cola, de color pardo y la región ventral, amarilla. La cabeza es de color gris plumizo y posee una línea oscura a nivel del ojo. El pico es largo, fino y algo curvo en dorsal y de color negro. El iris es rojo.



Presenta una corona anaranjada oculta y la muestra cuando se excita. La garganta es blanca. Las patas son largas, y oscuras. En los ejemplares juveniles, los colores son más pálidos.

Habita ambientes urbanos y rurales. Es confiado y pasa mucho tiempo en el suelo, buscando insectos, que es la base principal de su dieta. Caza mediante cortas carreritas y pequeños saltos. Se lo ve solo o en pareja.

Picabuey



Es una postal típica encontrarlo posado en el lomo de los animales de granja como vacas y caballos.



Orden Passeriformes

Pico de plata
(*Hymenops perspicillatus*)

Anillo periorcular y pico amarillentos.

El nombre...

Hymenops (Gr) significa "membrana en el ojo" y *perspicillatus* (Lt) "con anteojos".



Es un ave pequeña, que mide 13cm aproximadamente. El macho es completamente negro, con una pequeña mancha blanca en las remeras que se hace muy visible durante el vuelo. Tiene un anillo orbital muy desarrollado de color amarillo pálido y el iris que es del mismo color, parece parte de éste. El pico también es amarillo pálido, largo y fino. Las patas son oscuras.

Pico de plata

Las hembras son muy diferentes los machos, aunque de igual tamaño. La parte dorsal del cuerpo es pardo con estriaciones negras y la parte ventral es más clara y también tiene estriás. Presenta como el macho, un anillo orbital desarrollado de color amarillo pálido, al igual que el iris. Las remeras de las alas son rufas y se ven claramente durante el



vuelo. Los ejemplares juveniles son similares a las hembras, pero el anillo orbital está muy poco desarrollado y el iris es negro. Además los machos juveniles presentan estriaciones negras.

Habitán ambientes acuáticos y con pastizales altos desde donde cazan insectos, principal componente de su dieta. También se lo puede encontrar en el suelo o posado en un poste. Son bastante solitarios y es difícil ver a la pareja junta. La hembra permanece más oculta que el macho.



Pico de plata



Construyen el nido de materia vegetal, en forma de copa y con relativa profundidad, recubierto en el interior con materiales suaves.

Sabías que...

Se habla de DIMORFISMO SEXUAL cuando podemos diferenciar por características externas, machos de hembras. En el caso de muchas aves, entre ellas el pico de plata, a esta diferencia de sexo la podemos conocer por el color del plumaje. En general, los machos tienen colores más llamativos que las hembras.

Orden Passeriformes



Tacuarita azul
(*Polioptila dumicola*)

Gris azulada
y cola larga.
Macho con
antifaz negro.

El nombre...

Polioptila (Gr) significa "plumas grises" y *dumicola* (Lt), que habita los espinos.



Es un ave pequeña, mide 11 cm aproximadamente. Es de color gris azulado, más intenso en la región dorsal y más pálido



Tacuarita azul



en la zona ventral llegando a ser casi blanco en el vientre. La cabeza es grande con respecto al cuerpo y no presenta un cuello marcado. Los machos poseen un antifaz negro que permite diferenciarlo de la hembra a simple vista. El pico es muy fino, largo y de color negro. Las alas son pequeñas y presentan filetes negros con reborde blanco muy llamativo. La cola es angosta, de color negro, rígida y se la ve casi siempre erecta.



Las hembras tienen auriculares claros y en posterior del ojo, una manchita negra.



Orden Passeriformes

Zorzal colorado
(*Turdus rufiventris*)

Pardo con
abdomen
canela.

El nombre...

Turdus (Lt) "el tordo", y *rufiventris* (Lt) "con
vientre rojo".




Mide 23cm, aproximadamente. La parte dorsal del cuerpo y la cola son pardo grisáceo. La garganta es blanca con estriaciones en color pardo oscuro. El pecho es pardo claro y el resto de la parte ventral del cuerpo es rufo anaranjado, por ésto se lo llama vulgarmente zorzal "colorado".

Zorzal colorado



Presenta un anillo orbital anaranjado en contraste con el iris que es negro. El pico es amarillo y se vuelve más intenso en los adultos. Los ejemplares juveniles se diferencian de los adultos, en que presentan en la garganta y el pecho manchas pardo oscuras, en lugar de estriaciones. Una de las cualidades del zorzal es su canto. Desde antes del amanecer y especialmente en primavera se lo puede escuchar y se lo considera uno de los cantos más lindos de las aves de nuestro país.



Habita todo tipo de ambientes y es muy común verlo en zonas urbanas, plazas y parques con árboles. Se lo ve solo o en pareja. Es bastante terrícola, deambula y se detiene buscando lombrices, su alimento predilecto.



Zorzal colorado



Otros invertebrados y una gran cantidad de frutos completan su dieta. Realiza un vuelo corto y rápido y se lo puede ver posado o saltando de rama en rama. Construye su nido en árboles frondosos y a considerable altura. Éste es una semiesfera construido con ramitas, pastos secos, musgos y otros materiales sintéticos que encuentra por su cercanía al hombre. Todo esto intercalado con barro y forrado en su interior con materiales más suaves, como raíces muy finas. En el mismo, coloca 3 huevos de color celeste con pintitas marrón rojizas.



Orden Passeriformes

Calandria real
(*Mimus triurus*)

Alas con notable banda blanca.

El nombre...

Mimus (Gr) "mimo, imitador" y triurus (Gr) "tres colas".



Mide 20cm aproximadamente. El cuerpo es estilizado, la parte dorsal es gris pardo con la rabadilla rufa y la ventral es canela. La cabeza es pequeña y presenta cejas blancas bien marcadas. El pico es largo, fino y curvo, adaptado para cazar insectos. Las alas son gris oscuro y presentan una franja blanca. La cola es larga, negra en la región dorsal y blanca en la ventral.

Calandria real



Las patas son largas, esto indica que tiene el hábito de caminar mucho. Los ejemplares juveniles, presentan la franja alar blanca más delgada. Se distribuye por todo el país, pero en la parte central es donde se halla más concentrada. Las que se encuentran más al sur, migran a la zona central en otoño e invierno.

Prefiere ambientes poblados, áreas arboladas con arbustos bajos, pastizales y campos. Es común verla en el suelo, desplazándose rápido, con la cola y la cabeza erguidas y subiendo hasta las ramas que usan de posadero para volver a descender al instante.



Calandria real



Vive en pareja o en grupos familiares. Se alimenta de lombrices, algunos frutos y de insectos y en este sentido, cumple una importante función de control ambiental.

Una de las características más llamativas de esta ave es su canto, que según se dice es el mejor de todas las aves del mundo; además de su capacidad de imitar. Esto ha hecho que sea perseguida y encerrada, para su comercialización.



Orden Passeriformes

Pepitero gris
(*Saltator coerulescens*)

Doros gris,
ceja blanca.

El nombre...

Saltator (Lt) "saltador, bailarín" y *coerulescens* (LT) "que se vuelve azul oscuro".

Este género tiene como característica su canto melodioso, el pico grueso y las cejas bien marcadas.

El pepitero gris mide 20cm aproximadamente. El

cuerpo es grande en relación a los demás integrantes de esta gran familia. La parte dorsal es gris y la ventral es canela. La cabeza también es gris con el pico negro.



La garganta es blanca delineada a cada lado por una línea negra. La cola es larga, de color gris y las patas también son grises. Los ejemplares juveniles presentan un tono más verdoso y estriaciones en ventral.

Pepitero gris.



Habita zonas arboladas, montes abiertos y en proximidad a los cursos de agua. Se lo ve generalmente en parejas, en árboles de mediana altura y muchas veces también en el suelo. Su dieta se basa en semillas, granos y frutos. La pareja canta a dúo y su canto es muy agradable, motivo por el cual han sido y siguen siendo perseguidos, para encerrarlos en jaulas. También en pareja construyen el nido, con fibras vegetales y en forma de tacita



Orden Passeriformes

Chingolo

(*Zonotrichia capensis*)

Franjas negras
en cabeza.
Nuca
rojiza.

El nombre...

Zonotrichia (Lt) "cabello a fajas" y *capensis* (Lt) "del cabo".

Mide 12cm, aproximadamente. En cuanto a su morfología, tiene similitudes con el gorrión; son tantas que muchas veces se los confunde. Su cuerpo es pequeño, en dorsal es de color gris pardo con estriaciones negras y en ventral es gris claro, casi blanco. La cabeza es gris y presenta franjas negras en la corona, detrás de los ojos y en ventral de éstos. La nuca




es rufa. Las alas son cortas y redondeadas, de color negro con estriaciones canela y el reborde blanco. El pico es corto, robusto y de color negro. Las patas son de color gris y sus dedos se adaptaron para posarse en la rama de los árboles: presenta 3 hacia adelante y uno hacia atrás.

Chingolo



En los ejemplares juveniles, los colores son más tenues y en ventral del cuerpo presenta estriaciones oscuras. Presenta un copete gris que se deja ver ante determinados estímulos.

Habitan todo tipo de ambientes, especialmente lugares con árboles, arbustos, cultivos o plantaciones y es muy común verlos en cercanía al hombre. Se los observa en parejas o grupos, a veces numerosos, que se dispersan fácilmente ante situaciones de alarma. Son muy inquietos y realizan un vuelo veloz, pero la mayoría de las veces se lo ve en el suelo, caminando o dando pequeños saltitos en busca de comida. Se alimentan de semillas e insectos; pero próximos a las casas, también consumen restos de alimentos como migas de pan.



Chingolo

Se los oye cantar desde temprano por la mañana y continúan durante todo el día, incluso muchas veces por la noche. Construyen su nido a baja altura, con ramas, palitos y restos de vegetales y en el mismo colocan 3 ó 4 huevos. Es común encontrar entre éstos, un huevo de tordo renegrido, al que empollan como propio.



Sabías que...

Como muchas otras aves, los chingolos suelen ser víctimas de los ataques con gomera. La ciudad de Coronda es pionera en prohibir el uso de gomeras, rifles de aire comprimido, etc. La misma fue sancionada el día 5 de setiembre de 2015, es la Ordenanza N° 200/2015

Orden Passeriformes

Varillero negro

(*Agelaius cyanopus*)

Color negro.
Pico robusto.

El nombre...

Agelaius (Gr) significa "gregario", hace referencia a que esta ave cría en colonias y forma grandes bandadas en el invierno y *cyanopus* "de pies azul oscuro".

El varillero negro mide 19 cm, aproximadamente. Los machos son totalmente negros y su plumaje es muy brillante. La hembra es diferente al macho: la zona ventral del cuerpo es amarilla, mientras que dorso, flancos y cabeza son marrones con estriás negras. La cola también es de color negro. El plumaje de los juveniles es similar al de las hembras.



Quando los machos juveniles pasan al plumaje adulto

Varillero negro



definitivo, comienzan a cambiar las plumas desde la cabeza. El pico es cónico, recto y agudo.

Macho



Habita ambientes acuáticos: pastizales y pajonales en esteros, bañados y alrededores. Se lo ve en pareja o en pequeños grupos, entre la vegetación acuática flotante o en los árboles en la orilla, donde encuentran su alimento: semillas, frutos e insectos.

Hembra



Dato Útil

Es fácil confundir al varillero negro con otra ave gregaria, el tordo renegrido. Se los puede diferenciar en el brillo del plumaje: en el varillero es negro azabache, mientras que en el tordo los reflejos son azul- violáceos.



Orden Passeriformes



Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomea*)

Color rufo en
dorso.
Garganta
amarilla

El nombre...

Certhiaxis (Gr) significa "de pico curvo" y *acinnamomea* "acanelado, de color canela".

Esta ave de cuerpo pequeño mide entre 13 y 15 cm. Presenta el dorso de color castaño y la zona ventral blancuzca, al igual que las cejas. Es llamativo el color amarillo de la garganta, el cual es más manifiesto en los juveniles. El pico



es corto y puntiagudo de color negro. Las alas son cortas y redondeadas y al igual que la corona son de un color rojizo con las puntas más oscuras. La cola es larga, rígida y escalonada, redondeada en la punta, y de color rojizo como las alas. Habita zonas de bañados y humedales. Es muy inquieto y confiado.



Curutié colorado



Habita zonas de bañados y humedales. Es muy inquieto y confiado. Se lo suele ver en pareja y junto a la vegetación más próxima al agua, en busca de alimento. Su dieta se basa en pequeños insectos y otros artrópodos, que atrapa entre las hojas de las plantas acuáticas.



Orden Passeriformes

Viudita blanca
(*Fluvicola albiventer*)

Color blanco
parte ventral.
Corona y
dorso oscuro.

El nombre...

Fluvicola (Lt) significa "la que vive en el río" y *albiventer* "vientre blanco", haciendo referencia al color blanco del vientre.

Esta llamativa ave mide unos 12 cm. Presenta la cabeza y partes ventrales del cuerpo de color blanco; mientras que la nuca, el dorso y las alas son de un contrastante color negro. Las alas, presentan filetes blancos que suelen desaparecer con el tiempo a causa del desgaste. El pico es fino y la cola es corta; ambos son negros.



Se la suele en parejas o en grupos pequeños.

Viudita blanca



Frecuenta bañados o humedales donde se disimula entre la vegetación acuática. Se alimenta de insectos, que obtiene desde árboles bajos que usa como perchas o caminando sobre la vegetación acuática o a orillas del agua.



Orden Passeriformes

Cardenal común
(*Paroaria coronata*)

Copete rojo.
Inconfundible.

El nombre...

Paroaria es nombre tupí y *coronata* significa "con corona", haciendo referencia al copete.




El cardenal es, sin duda, una de las aves canoras más conocida por todos. Mide entre 17 y 19 cm. Cabeza y pecho son de un color rojo brillante; en los juveniles esta zona es parda o rojo pálido y se vuelve roja brillante a medida que crecen. Un vistoso copete rojo adorna la cabeza de este ave. Por detrás de la cabeza, se puede observar un collar de color blanco. El dorso del cuerpo es plumizo y la zona ventral, blanca. El pico es claro, robusto, corto y cónico. Las patas son cortas, de color negro.

Cardenal común



Se lo puede encontrar en zonas de arbustos o monte abierto y en épocas invernales se lo ve en el suelo, buscando semillas, que son la base de su dieta. Se lo puede observar en pareja o en grupos, a veces numerosos.



Protegidos por la Ley ...

El cardenal, junto a otras muchas aves, es una especie muy frecuente de encontrar en cautiverio. Este hecho, lamentable y común, representa un acto delictivo. Toda la fauna silvestre argentina, está protegida por la Ley Nacional 22.421, la cual prohíbe terminantemente la compra, venta y tenencia de nuestros animales silvestres.



Orden Passeriformes


Sietevestidos (*Pospiza nigrorufa*)

Amplia ceja y
contraceja
blancas.
Pecho rufo.

El nombre...

Pospiza (Gr) significa "pinzón de la hierba" y *nigrorufa* "negra y roja", haciendo referencia a los colores.



Es un ave pequeña, que mide entre 13 y 15 cm. Posee un plumaje gris pardo en el dorso y castaño rojizo en la zona ventral. A nivel del abdomen presenta una mancha blanca. La cabeza es gris oscura, con antifaz negruzco. Se destacan en esta zona cejas y malar de color blanco. El pico es negro, corto y fino.



Las alas y la cola son negruzcas. Los juveniles se diferencian por su color más pardo y por presentar manchas blancas en la parte ventral del cuerpo y en el pecho.

Habita en zonas húmedas, de bañados y pastizales altos, zonas de arbustos y matorrales. Se lo ve solo o en pareja, pero es más común oírlo que verlo.

Siete vestidos



Realiza vuelos cortos y bajos o se posa en perchas, donde se lo oye cantar. Su dieta se basa en semillas e insectos.



Nosotras.



Claudia Nigro

Médica Veterinaria. Especialista en Salud Animal, con orientación en Epidemiología. Cátedra Libre de fauna silvestre. Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre.

Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario

María Florencia David

Licenciada en Biología, con orientación en Zoología.
Cátedra Libre de fauna silvestre. Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre.
Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario

Cintia Manoni

Médica Veterinaria. Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre. Cátedra Libre de fauna silvestre.
Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario

Nuestros sitios:

www.catedralibrefaunasilvestre.blogspot.com
<https://www.facebook.com/catedralibrefaunasilvestre>
<https://www.facebook.com/catedralibrede.fauanasilvestre>
conservacionfaunasilvestre@gmail.com